



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

維生素A・D補充劑

樂達富咀嚼錠

NOARL AD CHEWABLE

衛署藥輸字第023182號



- 本藥含有維生素A可以緩和因使用電腦或駕駛汽車所引起之眼睛乾澀感。
- 本藥含有維生素D₃及沈澱碳酸鈣，適合發育期兒童之骨骼及牙齒保健。

〔成分・分量〕 每錠含有

Vitamin A	1,000 I.U.
Vitamin D ₃	100 I.U.
Vitamin C	50 mg
Vitamin C Sodium	14.06 mg
(eq. to Vitamin C)	12.5 mg
Precipitated Calcium Carbonate	25 mg
(eq. to Calcium)	10 mg

〔適應症〕

維生素A・D・C及鈣質缺乏症。

〔用法・用量〕

15歲以上，1次2錠。7歲以上未滿15歲，1次1錠。1日2次，咬碎後吞服或含在口中慢慢溶化吸收。**醫師藥師藥劑生指示藥品**

（維生素的知識）

- 維生素A可強化皮膚及粘膜，維護眼睛之健康，也是眼睛網膜細胞（感光組織）所不可或缺的成分，具有維持正常視覺的功能。
鰻魚、豬肝、南瓜、紅蘿蔔等食物中含有豐富的維生素A。
- 維生素D可促進鈣質的吸收，維持骨骼及牙齒的強度。
維生素D可經由接觸陽光，在人體內自行產生。且魚肝油中亦含量豐富。但對於不常接觸陽光或討厭魚類食物者，應特別注意容易缺乏維生素D。
- 維生素A及D服用過量會積蓄在人體內，因此必須遵照規定的用法、用量服藥。



〔注意事項〕

1. 下列情形者，在服用前，應先請教醫師或藥師
 - (1) 目前正在接受醫師診治的病人。
 - (2) 懷孕3個月以內或希望懷孕的女性（有報告指出：懷孕前3個月至懷孕3個月為止之期間內，若每日攝取維生素A超過10,000國際單位之孕婦所產下之新生兒患有先天異常的比例會升高）。
2. 服用之際，請注意下列事項
 - (1) 必須遵照規定之用法及用量服藥。
 - (2) 給予孩童使用時，應在監護人的督導下服藥。
3. 服用中或服用後，請注意下列事項
 - (1) 服用本藥期間內，若有嘔心，嘔吐，下痢，搔癢等症狀發生時，必須停止用藥，同時應請教醫師或藥師。
 - (2) 持續服用本藥一個月後，仍未見症狀有所改善時，必須停止用藥，同時應請教醫師或藥師。
4. 儲藏及使用上應注意之事項
 - (1) 請置於小孩不易取食之處。
 - (2) 服用後請立即旋緊瓶蓋，貯放在乾燥陰涼處，並避免陽光直射。
 - (3) 為避免誤用及保持品質之安定，請勿將本藥改裝於其他容器內。
 - (4) 超過使用期限之藥品請勿服用。
 - (5) 三個月以下嬰兒不宜使用。

製造廠名稱 佐藤製藥株式會社 (SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. HACHIOHJI FACTORY)
日本國東京都港區元赤坂1丁目5番27號
(P)1468 HAZAMA-CHO, HACHIOHJI, TOKYO, JAPAN
(O)1-5-27, MOTOAKASAKA, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN

藥商名稱 佐藤製藥股份有限公司
台北市基隆路一段333號4樓