



sato

HEALTHCARE INNOVATION

鎮 暈 劑

雅寧糖衣錠

AIRMIT S.C. TABLETS

エアミット

衛署藥製字第040049號



- 本藥係具有甜味之乾式糖衣錠，不須開水亦可吞服。
- 11歲以上之孩童及可服用本藥。
- 本藥之錠劑外層為白色，中間則含有淡橙色之內核。

【用法・用量】醫師藥師藥劑生指示藥品

搭乘飛機、汽車、船之前30分鐘，30-60分鐘或60分鐘使用，可再依藥物之作用時間，給予維持劑量，一天可服用3-4次，成人(15歲以上)，1次服用2錠。孩童(11歲以上未滿15歲)，1次服用1錠。

【適應症】

預防或緩解暈車、暈船、暈機所引起之頭暈、嘔吐、頭痛、噁心。

【成分・分量】每錠含有

Dimenhydrinate	25mg
Scopolamine Hydrobromide	0.075mg
Anhydrous Caffeine	20mg

【緩和動暈症的建議】

1. 保持充足的睡眠。
2. 飲食稍減，但切勿過食或空腹。
3. 調治胃腸之狀況，特別是，改善便秘之症狀。
4. 穿著寬鬆舒適的衣服。
5. 遠望車窗外之景物，或是，與他人開懷聊天。

【副作用】

思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。

【注意事項】

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

【警語】

1. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，請不要使用此藥。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝病病患不得使用。
3. 老年人應小心使用本劑，11歲以下不宜服用本劑。
4. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難，請勿服用此藥。
5. 服用此藥時不得與酒精性飲料合用。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
7. 服用本藥後，勿駕車或操作危險器械。
8. 如需服用超過兩劑以上，必須至少間隔4小時。

佐藤製藥股份有限公司新竹廠

新竹縣湖口鄉光復北路七號

TZ-2 96-03-10000

