



sato

HEALTHCARE INNOVATION

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



点眼薬
目のかゆみ、結膜充血に

ドラマソフト

抗ヒスタミン剤配合

ドラマソフトは…

- 花粉、ハウスダストなどによってひき起こされる目のかゆみや結膜充血に効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。 はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人。 緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用後、右の症状があらわれた場合
 - (2) 目のかすみ改善されない場合
 - (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

【効 能】

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

日常生活の中で私たちの目は、花粉・ハウスダスト・大気汚染などの影響を受けています。これらが原因で起こるアレルギー症状はさまざまですが、「目のかゆみ」が最も多く、つい、かいてしまうことによって結膜充血なども起こってきます。



【用法・用量】

1日3～6回、1回2～3滴ずつ点眼します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量と働き】15mL中

成 分	分 量	働 き
グリチルリチン酸二カリウム	15mg	かゆみの原因となる炎症を抑えます。
塩酸ジフェンヒドラミン	3mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみを抑えます。
コンドロイチン硫酸ナトリウム	7.5mg	涙の粘度を高めて有効成分の効果を持続させるとともに、角膜を保護し症状の改善をたすけます。

添加物として、塩化ベンザルコニウム、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、L-メントール、リュウノウ、エデト酸Naを含みます。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるためで、ご心配ありません。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。



視樂明點眼液 DRAMA SOFT

衛署藥輸字第024042號



【成分・分量】 Each ml contains :

Dipotassium Glycyrrhizinate.....	1 mg
Diphenhydramine Hydrochloride	0.2 mg
Sodium Chondroitin Sulfate	0.5 mg

【適應症】

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、眼睛癢、眼睛疲勞。

【用法・用量】

一天3至6次，每次1至2滴。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 過期眼藥水，請勿使用。本藥開瓶30天後請勿繼續使用。
6. 藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
7. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。
8. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少5分鐘後點藥。
9. 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。

【警語】

1. 以下情況應停藥立即就醫：
 - (1) 連續使用三天（或72小時）症狀未解除。
 - (2) 使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - (3) 發生過敏反應。
 - (4) 青光眼（Glaucoma）患者。
2. 對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
3. 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。

【包裝】

100公撮以下塑膠瓶裝。

【儲藏】

25℃室溫儲藏，禁止放置於40℃以上之高溫地方。

製造商名稱 佐藤製藥株式会社
日本國東京都港區元赤坂1丁目5番27號

藥商名稱 佐藤製藥股份有限公司
台北市基隆路一段333號4樓