




sato

HEALTHCARE INNOVATION

懷舒樂三層錠

HEIGHT SUCRAL 3 LAYERS TABLET

衛署藥製字第 046200 號



0462002

【成分・分量】 每錠含有：

Sucralfate	125mg
Sodium Bicarbonate	75mg
Pulverized Scopolia Extract	25mg
Diasmen SS	5mg
Lipase AP6	5mg

【適應症】

腹部膨滿、胃部疼痛、噁心、食慾不振。

【用法・用量】成人(15歲以上) 1次4錠，1日3次。每餐飯後或兩餐間服用。
醫師藥師藥劑生指示藥品**【注意事項】**

1. 有下列情事者，在服用前請先詢問醫師或藥師：
 - (1) 目前為止曾因藥物而引起各種過敏者(例如：發疹、發紅、發癢等)。
 - (2) 具有腎臟障礙者。
 - (3) 正在接受醫師治療者。
2. 服用時，請注意下列事項：
 - (1) 請遵守規定之用法及用量服藥。
 - (2) 請勿同時服用其他腸胃鎮痛鎮靜藥。
3. 服用中或服用後，請注意下列事項：
 - (1) 因服用本藥而出現過敏症狀(例如：發疹、發癢等)時，應停止服用並詢問醫師或藥師。
 - (2) 服用本藥後，偶爾會出現口渴、便秘等現象。
 - (3) 服用本藥兩星期左右，症狀仍未有所改善時，應暫時停止服用並詢問醫師及藥師。
4. 有關保管及處理事宜，請注意下列事項：
 - (1) 請置於小孩接觸不到之處。
 - (2) 請避免陽光直射，並儘量旋緊瓶蓋保存於濕氣少之陰涼處所。
 - (3) 為保持品質並避免誤用，請勿將本藥改裝於其他容器內。
 - (4) 超過使用期限之藥品請勿使用。
5. 除服用本藥之外，在日常生活中也請留意下列事項：
 - (1) 隨時隨地保持好心情。
 - (2) 酒類及咖啡、香煙等對胃部負擔較大的東西，請儘量節制。
 - (3) 請避免暴飲暴食，應養成規律而正確之飲食習慣。

【警語】

1. 本藥含碳酸氫鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，對牛奶或乳製品耐受度低者、每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
3. 有些病人可能對酵素過敏，偶有過敏現象。

【包裝】

24~1000錠玻璃瓶裝。

【儲藏】

室溫(25°C以下)儲藏。

佐藤製藥股份有限公司新竹廠

新竹縣湖口鄉光復北路七號

TZ-2 96-08-5000