



sato

HEALTHCARE INNOVATION

鼻塞、流鼻水治療劑

鼻通「噴液劑」

NAZAL「SPRAY」

ナザール「スプレー」

衛署藥製字第 032860 號



【成分・分量】Each ml contains:

Naphazoline hydrochloride	0.5mg
Chlorpheniramine maleate	5.0mg
Benzalkonium chloride	0.1mg

【適應症】

鼻塞、流鼻水、打噴嚏。

【用法・用量】

每 3 ~ 4 小時 1 次，壓擠容器 1 ~ 2 次，將藥液噴於鼻腔內。
醫師藥師藥劑生指示藥品

【副作用】

思睡、倦怠感、偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。

【注意事項】

1. 需置於小孩接觸不到之處
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，有高血壓、心臟病、糖尿病、甲狀腺機能亢進、綠內障之患者不建議自行使用。
5. 7歲以下之嬰幼兒，使用前請洽醫師。
6. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
7. 本藥使用過度，有再引起鼻塞及招致二次充血之虞，必需嚴守規定之用法用量。
8. 本藥限供點鼻用，禁止使用於眼睛及耳朵。
9. 使用本藥後，若有發疹、發紅、腫脹、刺激感等症狀時，必須停藥立即就醫。
10. 本藥連續使用達十天，必須停用2~3天，才能再使用，切勿長期持續使用。
11. 本藥連續使用三天後，如果症狀沒有改善時，必須停藥立即就醫。
12. 鼻塞嚴重時，一次噴多劑量並不會有顯著藥效，因為藥液無法滲入鼻腔內部，可先行噴單一劑量，待數分鐘後再噴一次。
13. 容器有加大設計，多出噴液所須之空間，藥液係按照標示量裝填，並無減少。



0328603



【警語】

1. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得使用。
2. 老年人應小心使用本藥，2歲以下之嬰幼兒不建議使用。
3. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，勿使用本藥。
4. 使用本藥時不得服用酒精性飲料。
5. 除非醫師、藥劑生或醫師指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
6. 使用本藥後，若引起思睡、倦怠感等症狀時，請勿駕車或操作危險器械。

佐藤製藥股份有限公司新竹廠

新竹縣湖口鄉光復北路七號

TZ-3 96-08-10000