



sato

HEALTHCARE INNOVATION

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



点眼薬
結膜充血・目の疲れに

ノアル[®]A

塩酸ナファゾリン、
ビタミンB₁₂・B₆配合

ノアルAは…

- 紫外線などによる目の炎症にグリチルリチン酸二カリウムが、また、結膜充血には塩酸ナファゾリンが効果をあらわします。
- 目の疲れに効果をあらわすビタミンB₁₂・B₆を配合しています。
- さしごこちのよいピンク色の澄明な目薬です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。 はげしい目の痛み
 - (5) 次の診断を受けた人。 緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - (1) 使用后、右の症状があらわれた場合
 - (2) 目のかすみ改善されない場合
 - (3) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

【効 能】

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

【用法・用量】

1日3～6回、1回2～3滴ずつ点眼します。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 過度に使用しますと、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量と働き】15mL中

成 分	分 量	働 き
ビタミンB ₁₂	0.75mg	視神経の働きを整え、新陳代謝を促進し、目の疲れに効果をあらわします。
ビタミンB ₆	15mg	
グリチルリチン酸二カリウム	15mg	結膜充血、紫外線などによる目の炎症、まぶたのただれに効果をあらわします。
塩酸ナファゾリン	0.45mg	結膜充血を改善します。

添加物として、塩化ベンザルコニウム、ホウ酸を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の点眼後、口中に甘味を感じることがありますが、これは本剤に含まれるグリチルリチン酸二カリウムが涙道を通して口中に伝わってくるためで、ご心配ありません。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光や蛍光灯の光に当たらないようにして、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
(ビタミンB₁₂は光に当たると分解して退色します。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (6) 温度40℃以上となる所に置かないでください。車の中(ダッシュボード等)や暖房器具の近くなどに放置すると、容器が変形することがあります。
- (7) 本剤は、ピンク色の目薬ですので、衣服につかないように注意してください。もし衣服についたときは、すぐに水で洗い流していただければシミになりません。
- (8) 容器のネジ部に成分の赤い結晶がつくことがありますが、このような場合には清潔なガーゼなどでふき取ってから使用してください。



“佐藤”視朗點眼液

NOARL A

衛署藥輸字第024073號

【成分・分量】 Each ml contains :

Dipotassium Glycyrrhizinate.....	1 mg
Naphazoline Hydrochloride.....	0.03 mg
Pyridoxine Hydrochloride	1 mg
Cyanocobalamin	0.05 mg

【適應症】

暫時緩解因輕微眼部刺激所引起之不適、眼睛紅、眼睛疲勞。

【用法・用量】

一天3～6次、每次1～2滴。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光及日光燈直射，宜保存於陰涼之處（25℃以下）。
3. 使用前，請洗淨雙手。
4. 請依照藥品標示使用。
5. 過期眼藥水，請勿使用。本藥開瓶30天後請勿繼續使用。
6. 藥液混濁，變色或出現異物時請丟棄。
7. 為避免污染藥品，使用時勿碰觸藥瓶瓶口。
8. 使用兩種眼藥水時，請隔開至少5分鐘後點藥。
9. 使用兩種眼藥時，請先使用藥水再用藥膏；並請隔開至少10分鐘後點藥。

【警語】

1. 以下情況應停藥立即就醫：
 - （1）連續使用三天（或72小時）症狀未解除。
 - （2）使用後產生眼睛劇痛、視力模糊或持續發紅、腫、熱、刺激感。
 - （3）發生過敏反應。
 - （4）青光眼（Glaucoma）患者。
2. 對眼用製劑之主要成分、防腐劑或其他賦形劑過敏者，不推薦使用。
3. 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥之患者，不應自行購買使用。
4. 過度使用本藥會增加眼睛紅腫。
5. 青光眼患者，除非經醫師指示，否則不要使用本藥。

【包裝】

100公撮以下塑膠瓶裝。

製造商名稱 佐藤製藥株式會社
日本國東京都港區元赤坂1丁目5番27號

藥商名稱 佐藤製藥股份有限公司
台北市基隆路一段333號4樓