



解熱鎮痛劑

# 熱 得 平 錠

RINGL PYLENA

(非比林系)

衛署藥輸字第023543號



服用本劑前請務必詳讀本說明書，同時請善加保管本說明書以備需要時可參閱。

- 溶解後服用的解熱鎮痛劑。
- 非比林系的水楊酸對頭痛、發燒、生理痛等有止痛的效果。
- 不含引起思睡的成份。

### 【成分、含量】一錠中

Aspirin ..... 500mg    Anhydrous Caffeine ..... 50mg  
另含 Sodium Lauryl Sulfate, Aspartame 及香料等添加物。

### 〔適應症〕

解熱、鎮痛、(頭痛、牙痛、神經痛、風濕痛、機能性月經痛、肌肉痛、感冒引起的發燒頭痛)

### 〔用量、用法〕醫師藥師藥劑生指示藥品

下述為每一次的服用量，服用時請盡量避免空腹。以半杯水或溫開水(約80~100ml)溶解錠片後服用。服用需間隔4小時以上。

年 齡	1次服用量	1日服用次數
大人(15歲以上)	1錠	以3次為限
未滿15歲	請勿服用	

### 《警語》

未經與醫師諮商前，本劑不得使用於兒童或二十歲以下青少年之水痘或流行性感胃症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病雷氏症候群 (Reye's Syndrome) 有相關性。

### 〔使用上之注意事項〕

請遵守下列事項，否則較易引起現有症狀之惡化或引發副作用

1. 下述之人請勿服用
  - (1) 曾因服用本劑而引發過敏症狀的人〔如發疹、發紅、發癢、浮腫等〕
  - (2) 曾因服用本劑或其他感冒藥或解熱鎮痛劑而引發哮喘的人
  - (3) 未滿15歲的小孩
2. 服用本劑時請勿與下列藥品同時服用：
 

其他的解熱鎮痛劑、感冒藥、鎮靜藥
3. 服用時請勿喝酒
4. 請勿長期服用



〔服用前請先諮詢〕

1. 下述的人服用前請先向醫師，牙科醫師或藥師諮詢

- (1) 正接受醫師或牙醫師診療的人
- (2) 孕婦或可能懷孕的婦女
- (3) 高齡者
- (4) 本人或家族為過敏體質的人
- (5) 曾經有因藥品引起過敏症狀的人
- (6) 被診斷為有下列病狀的人

心臟病、腎臟病、肝病、胃、十二指腸潰瘍

2. 有下列情形發生時請立即停止服用。並持此仿單向醫師、牙醫師或藥師諮詢

(1) 服用後出現下列症狀時

相 關 部 位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、發癢
消 化 系 統	噁心、嘔吐、食慾不振
精神神經系統	暈眩

極罕見會出現下列嚴重症狀、但出現時請立即停藥並接受醫師診療

症 狀 名 稱	症 狀
休克 (Anaphylaxis)	服用後立即出現蕁麻疹，浮腫，胸口苦悶、並伴有 臉色蒼白，手腳冰冷，冒冷汗，呼吸困難等症狀
皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壞死症	伴隨高燒且同時有發疹、發紅、燒傷狀的水皰等激烈 症狀出現在全身的皮膚及口或眼粘膜等處
哮喘	

(2) 服用5~6次後症狀仍未改善時

〔有關用法及用量之注意事項〕

- (1) 請嚴守所定的用法、用量
- (2) 請充分攪拌溶解後服用
- (3) 本劑溶解後請立刻服用，溶解後請勿長久置放
- (4) 本劑請勿咬碎後服用
- (5) 本劑溶解服用後所殘餘的溶液請勿留存

〔保管上之注意事項〕

- (1) 避免日光直射，宜保存於乾燥陰涼處
- (2) 須置於小孩接觸不到處
- (3) 請勿改置於其他容器（因恐造成誤用或引起藥物變質）
- (4) 請勿服用過期品

藥 商 名 稱：佐藤製藥股份有限公司  
藥 商 地 址：台北市基隆路一段333號4樓  
消費者服務專線：0800-085208  
製 造 廠 名：Sato Pharmaceutical Co., Ltd. Hachiohji Factory  
製 造 廠 址：(Plant) 1468 Hazama-cho, Hachiohji, Tokyo, Japan  
(Office) 1-5-27, Motoakasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan