



sato

HEALTHCARE INNOVATION

賜多安膜衣錠

STONA F.C. TABLETS

衛署藥製字第 045540 號



0455403

【成分・分量】每錠含有：

Acetaminophen	325.0 mg
Dextromethorphan Hydrobromide	15.0 mg
Pseudoephedrine Hydrochloride	30.0 mg

【適應症】

緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、咳嗽、鼻塞)。

【用法・用量】

成人及12歲以上之孩童：1次1錠。每隔6小時服用1次，1日3~4次。未滿12歲之孩童：使用前請洽醫師。

醫師藥師藥劑生指示藥品

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：
 - (1)孕婦及授乳婦不建議自行服用。
 - (2)服用本藥時不得併服其他藥品。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
5. 不得併服含酒精飲料。

【警語】

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (一)3歲以下不建議自行使用。
 - (二)曾經因藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
4. 吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
5. 不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
6. 不要服用本藥超過七日。
7. 服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
8. 服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
9. 酒精警語：若每日喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問醫師是否能服用本藥，因為 Acetaminopen 可能造成肝



損害。

10. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
11. 服用 Monoamine oxidase inhibitor(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(Selective serotonin reuptake inhibitors(SSRI))者，不得使用含 Dextromethorphan 之本藥。
12. 本藥含 Pseudoephedrine hydrochloride 應注意下列事項：
 - (一) 除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
 - (二) 服用 Monoamine oxidase inhibitor(MAOI)期間，或停用 MAOI 兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有 MAOI，請詢問醫師或藥師。

【包裝】

6~1000錠鋁箔盒裝。

【儲藏】

室溫(25℃)儲藏。

佐藤製藥股份有限公司新竹廠

新竹縣湖口鄉光復北路七號

TZ-3 96-10-20000