



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

綜合維生素劑

維可樂得糖衣錠

VITAMINEN GOLD S.C. TABLET

衛署藥輸字第 023271 號

ビタミンゴールド



- ・本藥為多種維生素（A・B群・C・D・E）以及礦物質（鐵質・鈣質）所組成之橙紅色糖衣錠。（維生素及礦物質）
- ・維生素係碳水化合物、蛋白質及脂肪等在體內直接轉換為能量或變成身體組織成分所必須且是維持健康及成長不可欠缺之營養素。但是人體內所能合成之維生素無法充分供給或幾乎不能自行合成。因此就必須從食物或藥物等攝取而得。
- ・礦物質屬於無機物質，在人體內有近30種礦物質，其中又以鐵質及鈣質較容易導致缺乏現象。鐵質欠缺會造成貧血且全身之活動力降低，這是因為鐵質係構成血液中之紅血球所不可缺少之成分，在造血方面占有非常重要的功能。另外，鈣質係構成骨骼及牙齒的成分。在肌肉及神經活動方面占有重要任務。維生素及礦物質在維持健康及成長上有著重要的功能，每日不可欠缺，均衡地攝取是相當重要的。

〔成分・分量〕 每錠含有

Ferrous Fumarate	15 mg
Vitamin A	2,000 I.U.
Vitamin D ₃	200 I.U.
Vitamin B ₁ Nitrate	5 mg
Vitamin B ₂	2.5 mg
Vitamin B ₆ Hydrochloride	7.5 mg
Vitamin B ₁₂	5 μg
Vitamin C Sodium	35 mg
Vitamin E Calcium Succinate	6 mg
Nicotinamide	12.5 mg
Calcium Pantothenate	10 mg
Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate	55 mg
Calcium Carbonate	50 mg
(eq. to Total Calcium)	37.1 mg)

〔適應症〕

發育不良，營養補給，虛弱體質，熱性消耗性疾患之補助治療，妊娠婦之營養補給。

〔用法・用量〕

15歲以上，1次2錠。6歲以上未滿15歲，1次1錠。1日1次，飯後服用。

醫師藥師藥劑生指示藥品



〔注意事項〕

1. 下列情形者，在服用前，應先請教醫師或藥師
 - (1) 目前正在接受醫師診治的病人。
 - (2) 懷孕3個月以內或希望懷孕的女性（有報告指出：懷孕前3個月至懷孕3個月為止之期間內，若每日攝取維生素A超過10,000國際單位之孕婦所產下之新生兒患有先天異常的比例會升高）。
2. 服用之際，請注意下列事項
 - (1) 必須遵照規定之用法及用量服藥。
 - (2) 給予孩童使用時，應在監護人的督導下服藥。
 - (3) 本藥服用前及服用後30分鐘內，請勿飲用茶或咖啡。
 - (4) 未滿6歲之兒童請勿服用。
3. 服用中或服用後，請注意下列事項
 - (1) 服用本藥期間內，若有發疹，發紅，搔癢，食慾不振，胃部不適感，腹痛，噁心，嘔吐，便秘，下痢等症狀發生時，必須停止用藥，同時應請教醫師或藥師。
 - (2) 服用本藥後，尿液會呈黃色，這是正常現象，此因本藥含有維生素B₂之故。
 - (3) 服用本藥後，大便會呈黑色，這是正常現象，此因本藥含有鐵質之故。
 - (4) 持續服用本藥一個月後，仍未見症狀有所改善時，必須停止用藥，同時應請教醫師或藥師。
4. 儲藏及使用上應注意之事項
 - (1) 請置於小孩不易取得之處。
 - (2) 服用後請立即旋緊瓶蓋，貯放在乾燥陰涼處，並避免陽光直射。
 - (3) 為避免誤用及保持品質之安定，請勿將本藥改裝於其他容器內。
 - (4) 超過使用期限之藥品請勿服用。

製造廠名稱 佐藤製藥株式會社 (SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. HACHIOJI FACTORY)
日本國東京都港區元赤坂1丁目5番27號
(P)1468 HAZAMA-CHO, HACHIOJI, TOKYO, JAPAN
(O)1-5-27, MOTOAKASAKA, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN

藥商名稱 佐藤製藥股份有限公司
台北市基隆路一段333號4樓